

全国二级公立医院2023年度绩效监测结果公布 我市A档医院增至4家

近期，国家卫生健康委公布了全国二级公立医院2023年度绩效监测结果。我市参评的8家医疗机构（舞阳县人民医院、临颍县人民医院、郾城区人民医院、漯河市第二人民医院、漯河市第六人民医院、漯河医专三附院、舞阳县中心医院和召陵区人民医院）均取得了B档以上的优异成绩，A档医院由3家增至4家。

2022、2023年度全国二级公立医院绩效监测在保持原有评价方式相对

稳定的基础上，根据整体数据情况，将各医院档位划分为ABCD四档。A档：排名区间前20%，B档：排名区间20%至75%，C档：排名75%至100%，D档：2022年21所医院、2023年18所医院。2022年度我市3家医院A档，5家医院B档；2023年度我市4家医院A档，4家医院B档，较2022年度有了长足的进步。

市卫生健康委将根据国家卫生健康委公立医院绩效监测管理系统反馈

的数据和要求，统筹谋划，科学有序推进绩效监测工作，认真进行结果分析，持续改进医疗质量，提升运营

效率，落实改革发展各项任务，促进公立医院高质量发展。

李龙飞



漯河医专二附院

微创手术为4岁坠楼男童接断骨



医生为患儿进行手术。

漯河医专二附院提供

本报讯（记者 刘彩霞）近日，一名4岁的男童不慎从高处坠落导致骨折，被紧急送入漯河医专二附院（市骨科医院）进行治疗。该院小儿骨科团队迅速响应，火速开启绿色通道积

极抢救患儿，凭借精湛的技术为其进行手术。术后患儿恢复良好。

5月21日傍晚，一名男童不慎从四楼窗户翻落至一楼房顶，当即出现右大腿疼痛、肿胀、畸形及活动受

限。家长迅速将其送往当地县人民医院。经检查，患儿除头部、腹部存在多发性损伤外，右股骨近端及远端骨折，骨折端移位明显。鉴于伤势严重，患儿被紧急转送至漯河医专二附院。随后，经过CT检查，结果显示：患儿右侧股骨近段骨质不连续，骨折端可见碎骨片；股骨远端干骺分离错位，骨骺裂开。

随后，该院立即组织急诊科、普外科、胸外科、小儿骨科等科室专家开展多学科联合会诊。大家一致认为，患儿年龄小、骨折复杂，若采用传统的切开复位钢板内固定术，虽固定牢固，但创伤较大，且日后需要二次手术取出内固定物。为减轻患儿痛苦、加速患儿康复，经综合评估并与家属充分沟通后，医护团队决定为患儿实施微创治疗，避免后期再次手术。

经过充分术前准备，我市知名骨科专家、漯河医专二附院院长王齐超以及小儿骨科主任贺喜顺带领医护团队为患儿实施了右侧股骨远端骨折合并骨骺损伤切开复位克氏针内固定术。术中，面对患儿骨折间隙狭窄、伤处显露困难等挑战，手术团队成员

凭借精湛的技术，在微型C臂机辅助下，通过小切口精准置入克氏针进行牵引固定。手术仅用半个小时，术中患儿出血量较少。术后，复查X线片显示，患儿分离错位处复位良好。目前患儿情况稳定，正在康复中。

据悉，漯河医专二附院骨科（小儿骨科）是河南省医学重点专科、中国中部地区小儿骨科多中心成员单位、漯河市医学特色专科、漯河市中西医结合小儿骨科委员会主委单位、河南省慈善总会残疾儿童“逐梦行动”合作单位、漯河市残疾儿童肢体畸形矫治定点医院。该科技术力量雄厚，目前拥有医护人员18人，其中副教授2人、硕士研究生5人。该科可开展各种儿童骨折的微创治疗、儿童各种先天性和获得性畸形的治疗以及脑瘫导致的各种肢体畸形。其中，可应用3D技术治疗儿童肢体畸形，儿童股骨头坏死，儿童化脓性关节炎，急、慢性骨髓炎，儿童四肢骨肿瘤。该科全体医护人员将继续秉持科学、严谨、求实的态度，持续深耕微创技术领域，为患儿提供精准、优质的医疗服务。

胎盘早剥的识别与预防

胎盘早剥是指妊娠20周后，胎盘在胎儿娩出前部分或全部从子宫壁剥离。这是一种妊娠期的严重并发症，可能导致胎儿死亡及子宫卒中，对孕妇和胎儿的危害极大。

胎盘早剥的高危因素有哪些

1.血管病变：子痫前期、慢性高血压、慢性肾脏病等疾病会导致子宫螺旋小动脉痉挛或硬化，进而引起远端毛细血管坏死、破裂出血。出血增多后，会在胎盘和子宫壁之间形成血肿，最终导致胎盘与子宫壁剥离。

2.机械性因素：腹部外伤，例如撞

击或挤压，也可能引发胎盘早剥。

3.宫腔内压力骤降：羊水过多的孕妇如果发生胎膜早破或人工破膜，会导致宫腔压力骤降；双胎分娩时，第一个宝宝娩出过快也可能引发胎盘早剥。

4.其他因素：高龄多产、吸烟、既往有胎盘早剥病史、孕妇长时间仰卧位等，也可能增加胎盘早剥的风险。

胎盘早剥的临床表现有哪些

轻度胎盘早剥的孕妈症状可能不明显，而严重胎盘早剥的孕妈通常会持续腹痛、少量或大量阴道流血、腹部持续发硬、胎动减少等表现。

超声能诊断胎盘早剥吗


对于隐性或部分混合性出血且剥离面积较大的胎盘早剥，超声检查具有较大的临床诊断价值。然而，对于部分显性出血或剥离面积较小的早剥，超声的诊断价值

仍有一定局限性。

如何预防胎盘早剥

1.及时发现妊娠期高血压及慢性肾脏等疾病，积极就诊并及时治疗。

2.通过定期产检，早发现、早诊



■专家链接

于登锋，市三院副主任医师，超声科副主任。他先后进修于解放军总医院、北京大学第一人民医院、河南省人民医院及郑州大学第三附属医院，现任省医学科学学会介入超声专业委员会委员、市医学会超声专业委员会委员、市超声医学工程学会理事。他擅长胎儿产前超声诊断、心血管及腹部超声诊断、甲状腺及乳腺疾病超声诊断、新生儿超声诊断及超声引导下介入治疗等。

酸中毒的发生。

虽然对大部分产妇有利，但分娩镇痛也并非人人适用。兰江丽称，有阴道分娩禁忌证、麻醉禁忌证、凝血功能异常的产妇不可以采用分娩镇痛，有妊娠并发心脏病、药物过敏、腰部外伤史的产妇计划使用分娩镇痛前应向医生咨询能否使用。

尹玲介绍，我国自1963年开展“无痛”分娩以来，技术和镇痛方案不断优化，麻醉药量的控制和药物配方等也在不断更新。随着产科指南的更新、新产程定义和临床实践的相应调整，产妇进入产房后规律宫缩，只要有镇痛需求即可实施“无痛”分娩。

兰江丽提醒，申请分娩镇痛宜早不宜晚，到了“痛到不行”时通常宫缩已经比较频繁，产妇配合穿刺会有一定的困难，也增加了麻醉医生的操作难度。

据悉，近年来国家卫生健康委已出台多项举措，进一步规范分娩镇痛相关诊疗行为，提升产妇分娩镇痛水平。全国有近千家医院开展了分娩镇痛试点工作，多地积极推进，将分娩镇痛医疗服务项目纳入医保报销范围。“相信我国分娩镇痛普及率将进一步提高。”尹玲说。

据新华社

市中医院 爱眼日科普义诊进校园

6月4日下午，市中医院眼科副主任王中伟带领医护团队走进源汇区许慎小学，举办了以“预防近视，守护‘睛’彩”为主题的爱眼日科普讲座及义诊活动，进一步增强学生的视力保护意识，引导学生养成科学用眼、健康护眼的好习惯。

活动现场，该院眼科医师郭康杰用浅显易懂的语言和丰富的实例，向学生们详细讲解了眼睛的构造、功能及日常保护眼睛的重要性。他特别强调了合理用眼、定期休息、远离电子屏幕等保护视力的有效方法，并现场演示正确的用眼姿势和眼部放松操。同学们听得津津有味，纷纷表示要将

这些知识运用到日常生活中，好好保护自己的眼睛。

科普讲座结束后，在学校的组织下，学生分组有序地进行了视力筛查和屈光检测。医务人员借助专业智能的视力检测设备，严格执行规范操作流程，认真细致地为每名学生进行检查并做好记录。对于检查出视力有问题的孩子，医务人员及时向学校反馈，并给予专业的视力保健指导。

此次健康科普及筛查活动帮助家长和学校及时了解孩子的视力健康状况，增强了学生的爱眼、护眼意识，受到了学校师生的欢迎。

韩影

被毒蛇咬伤怎么办



资料图片

夏季，蛇类进入活跃期。随着我国环境保护力度的不断加大，曾经多栖息于山林、荒野、农村的蛇类如今在不少城市中也经常出没，导致蛇伤事件频繁发生，不得不防。

资料显示，蛇咬伤是我国常见动物致伤疾病，每年蛇咬伤病例数百万，其中被毒蛇咬伤人数为10万至30万。

遭遇毒蛇咬伤该如何正确应对呢？三亚市中医院创伤中心主治医师李畅认为应急处理是关键。他说，被蛇咬后应尽量避免剧烈活动，以免加快血液循环。拨打120急救电话的同时，尽可能记住蛇的基本特征，最好能拍摄到致伤蛇的照片。现场不要企图捕捉或追打蛇，以免二次被咬。如果蛇咬住不放，可用身边合适的工具促使其脱离。等待急救期间，可摘掉受伤部位的戒指、手镯、脚链等受限物品，防止因后续肢体肿胀导致无法取出而加重伤害。

李畅同时提醒，被蛇咬伤后应保持受伤部位低于心脏水平以下。若经

专业人士确认为无毒蛇咬伤，且创口较小，可用流动的清水清洗伤口并咨询医院是否需要就医。若患者出现恶心、意识丧失、呼吸和心跳停止，要立即侧卧或开展心肺复苏。不建议用止血带结扎、用刀切割伤口以及嘴吸、冰敷或烧灼伤口，更不能采用民间迷信方法等未经证实或不安全的急救措施，要尽快到安全处等待救援或立即前往附近医疗机构。

海南省人民医院急救中心副主任欧阳艳红表示，目前针对眼镜蛇、五步蛇、银环蛇、蝮蛇等几种典型蛇毒，部分医院储备了相应的抗蛇毒血清。因此，在条件允许的情况下，患者应去储备了血清的医疗机构接受治疗，以免耽误病情。

海南医科大学第一附属医院急诊和创伤外科副主任袁伟表示，抗蛇毒血清含有特定蛇毒成分抗体，是目前最常用的能特异性中和体内游离蛇毒、阻止其继续损害器官的“解药”，但不同的毒蛇咬伤一般须选择不同的血清治疗。而是否使用、使用何种、剂量多少，需要由专业医生综合判断。

预防远胜于救治。专家提示，出行时应提前充分了解环境，身处蛇类活跃区域如草丛、树林、溪边、石堆等环境中时，应仔细观察，时刻保持警惕。进入可能有蛇的区域最好穿高帮厚实的鞋靴和长裤，行走时可用长棍或手杖“打草惊蛇”。尽量避免夜间在可能有蛇出没的地方活动。此外，要谨慎选择户外休息地，不主动招惹蛇类。

据新华社

漫说健康



关灯后看手机对眼睛伤害有多大？首都医科大学附属北京同仁医院斜视与小儿眼科主任医师付晶近日在接受记者采访时说，黑暗环境中瞳孔扩大，让更多光线进入眼球，而手机屏幕产生的短波有害蓝光可穿透晶状体，长期照射可能损伤视网膜黄斑区，增加黄斑变性的风险。

新华社发



防范野生菌中毒，最关键的是从源头做起。“不认识的、不熟悉的、不易分辨的菌子绝不能食用。”中国科学院昆明植物研究所研究员杨祝良说，“‘头上戴帽、腰间系裙、脚上穿鞋’的野生菌一定不要吃。”

新华社发

本版组稿：王夏琼